

IN A NUTSHELL

la plateforme de connaissances innovante pour les généralistes

Score de Wells pour la thrombose veineuse profonde

S'appuyant sur des données d'anamnèse et des critères cliniques, le score de Wells pour la thrombose veineuse profonde (TVP) permet d'établir la probabilité d'être en présence d'une TVP. La probabilité pré-test qui en résulte aboutit à des recommandations pour la suite des démarches diagnostiques.

Cancer actif

Traitement au cours des 6 derniers mois ou palliation

Non Oui (+1)

Paralysie, parésie ou immobilisation récente des membres inférieurs

Non Oui (+1)

Alitement (? 3 jours) ou chirurgie majeure dans les 12 semaines passées

Non Oui (+1)

Douleur localisée ou induration le long des veines profondes

Non Oui (+1)

Enflure globale de la jambe

Non Oui (+1)

Enflure du mollet (? 3 cm) vs jambe asymptomatique

mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale

Non Oui (+1)

Œdème prenant le godet du côté symptomatique

Non Oui (+1)

Présence de veines collatérales superficielles (non variqueuses)

Non Oui (+1)

TVP démontrée antérieurement

Non Oui (+1)

Diagnostic alternatif au moins aussi probable que la TVP

Non Oui (-2)

Score de Wells pour la thrombose veineuse profonde:

Recommandation:

Interprétation**Score****Classification et recommandation**

- Thrombose veineuse improbable**
Recommandation: dosage des D-dimères
- ? 1
- Des D-dimères négatifs permettent d'exclure la TVP
- En cas de D-dimères positifs, écho-doppler pour exclure la TVP
- Thrombose veineuse profonde probable**
Recommandation : écho-doppler immédiat pour exclure la TVP
- ? 2

Références

1. Wells PS, Anderson DR, Rodger M et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2003; 349: 1227-1235